

POLLUTION DE L'AIR PAR LE DIOXYDE DE SOUFRE A MONTRAVEL

Seuil d'information et de recommandation



Communiqué du: **04/02/2016 15h00**

Observations: **Judi 04 février 2016**
terminé

Dépassement du seuil d'information et de recommandation : Alerte orange


Dans le secteur de Montravel, des concentrations élevées en dioxyde de soufre sont mesurées depuis 10h30 ce jeudi 04 février.

Le seuil d'information à destination des personnes sensibles, (fixé à 300 microgrammes de SO₂ par m³ d'air en moyenne sur une heure – [µg/m³]), a été dépassé à 13h45, avec une valeur de 317 µg/m³ (en moyenne horaire de 12h45 à 13h45).

La valeur limite horaire de 350 µg/m³ a également été dépassée à 14h00, avec une valeur de 355 µg/m³ (en moyenne de 13h00 à 14h00).

Le dépassement de seuil s'est terminé à 14h45, avec une valeur horaire glissante sur 15 min de 282 µg/m³.

| | |
|---|---|
| Zones concernées | Montravel - quartiers situés à l'Est de Doniambo |
| Polluant | dioxyde de soufre (SO ₂) |
| Valeur horaire (concentration) - heure d'apparition du dépassement | 317 µg/m ³ en moyenne de 12h45 à 13h45 |
| Valeur horaire (concentration) - heure de disparition du dépassement | 282 µg/m ³ en moyenne de 13h45 à 14h45 |
| Nb de dépassement(s) réglementaire(s) (sur 1 h) | 1 |
| Maximum horaire (concentration - heure) | 355 µg/m ³ en moyenne de 13h00 à 14h00 |
| Moyenne journalière | |



Conditions météorologiques et circonstances :

D'après les données de Météo France, des vents moyens de 11 à 17 kt avec des rafales atteignant 25 kt de secteurs ouest/sud-ouest à ouest ont été enregistrés de 11h à 14h.

Ces conditions favorisent la dispersion du panache industriel de Doniambo (centrale thermique - SLN) vers le secteur de Montravel.

D'après les données fournies par l'industriel, la centrale thermique de Doniambo a été alimentée en fioul à très basse teneur en soufre (TBTS) à partir de 10h25.

Pour mémoire, le **seuil d'information et recommandation** pour le SO₂ est de **300 µg/m³ en moyenne horaire**.

Il correspond à "un niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine **des groupes particulièrement sensibles** et à partir duquel des informations actualisées doivent être diffusées à la population". Ce seuil n'entraîne pas de consignes de modification des comportements, hormis pour les personnes connues comme sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion.

Recommandations en cas de Seuil d'information dépassé:

Il n'est pas nécessaire de modifier les déplacements habituels ni les activités sportives sauf pour les sujets connus comme étant sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion. Pour eux, il convient de privilégier les activités calmes et éviter les exercices physiques intenses, notamment s'abstenir de concourir aux compétitions sportives.

Il est demandé aux parents et à tous les personnels s'occupant d'enfants d'être vigilants vis-à-vis de l'apparition de symptômes évocateurs (toux, gênes respiratoires...) et de ne pas hésiter à prendre un avis médical.

Il convient d'éviter l'usage du tabac, de solvants ou autres produits irritants des voies respiratoires pour ne pas aggraver les effets de la pollution.

Le SO₂ en bref:

Le dioxyde de soufre provient principalement de la combustion des carburants fossiles (charbons, fiouls...) dans les secteurs de l'industrie, et des transports. Le dioxyde de soufre est un gaz irritant, associé à une fréquence accrue des hospitalisations pour maladies respiratoires et cardiaques.

À Nouméa, le dioxyde de soufre est essentiellement d'origine industrielle (centrale thermique de Doniambo). Il se retrouve dans l'air après la combustion du fioul lourd contenant du soufre.

Pour plus d'information sur la qualité de l'air, les indices quotidiens, les bulletins de résultats: www.scalair.nc

Les données communiquées par Scal-Air peuvent faire l'objet d'une invalidation technique ultérieure